

ARTHRITE, ARTICULATION PROTHETIQUE: INFECTION AIGUE, SEPTIQUE, LEGERE OU MODEREE CHEZ LE PATIENT AVEC FACTEURS DE RISQUE D'INFECTION SEVERE

• Aspects cliniques et commentaires

- S'applique à la grande majorité des patients avec arthrite sur articulation prothétique, seulement une minorité des patients est gravement malade.
- Traitement empirique seulement nécessaire chez les patients à risque d'infections sévères, ne doit pas être postposé jusqu'à la disponibilité des résultats de l'examen direct et des cultures.
- Facteurs de risque d'infections sévères.
 - Facteurs systémiques: malnutrition, insuffisance rénale ou hépatique, diabète sucré, hypoxie chronique, maladies du système immunitaire, malignités, âge extrême, immunosuppression, hémoglobinopathie (surtout drépanocytose), tabagisme.
 - Facteurs locaux: lymphœdème chronique, pathologie des grands ou petits vaisseaux sanguins, vascularite, stase veineuse, fibrose de rayonnement étendue, neuropathie.
- Drainage chirurgical ou rinçage par lavage pulsé impératif et urgent.
- L'assomption doit être faite que l'os adjacent est également infecté.

• Pathogènes impliqués

- *Staphylococcus aureus*.
- Staphylocoques à coagulase-négative.
- *Propionibacterium* spp.
- Streptocoques.
- Entérocoques.
- Entérobactéries.
- *Pseudomonas aeruginosa*.

• Traitement anti-infectieux empirique

- Régimes.
 - Résultats de la coloration Gram indisponibles ou non concluants.
 - Vancomycine + céfépime.
 - Vancomycine + ceftazidime.
 - Résultats de la coloration Gram disponibles et concluants.
 - Résultats suggestifs d'infection à coques à Gram-positif: vancomycine.
 - Résultats suggestifs d'infection à bacilles à Gram-négatif.
 - ▲ Céfépime.
 - ▲ Ceftazidime.
- Posologies standard.
 - Céfépime: 2 g iv q8h.
 - Ceftazidime: 2 g iv q8h.
 - Vancomycine: dose de charge de 25 à 30 mg/kg iv, immédiatement suivie soit par une perfusion continue titrée pour atteindre des concentrations sériques de 20 à 30 µg/ml soit par des perfusions intermittentes q12h titrées pour atteindre des concentrations sériques de vallée de 15 à 20 µg/ml.
- Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté): voir remarques préalables concernant l'arthrite sur articulation prothétique.